



799 E. Rialto Avenue ♦ San Bernardino, CA 92415-0011  
(909) 383-3060 ♦ Fax (909) 383-3212

ALLAN RAWLAND, MSW, ACSW  
Acting Public Health Director

TRUDY RAYMUNDO  
Assistant Director of Public Health

MAXWELL OHIKHUARE, M.D.  
Health Officer

## IMMEDIATE RELEASE

14 de Marzo del 2011  
NR #11-11

Contact: Daniel Perez, MSW  
Program Manager  
(909) 387-2693

## LA NUEVA CARA DEL VIH – MUJERES Y ADULTOS EDADES 47-65

**SAN BERNARDINO.** Los Centros para el Control de Detección y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos reporta que el Virus de Inmunodeficiencia humana sigue a niveles altos con 56.300 estadounidenses contrayendo la infección cada año. Más de 18.000 personas con SIDA mueren cada año.

Aunque los tratamientos para controlar el VIH/SIDA han progresado, la enfermedad continúa afectando a todos los sectores de la sociedad americana. El impacto de la enfermedad ha aumentado seriamente entre las mujeres y adultos edades 47-65.

Los CDC reportan que en el 2007 las mujeres y niñas mayores de 13 años como grupo, soportan más de un cuarto de las infecciones anuales nuevas de VIH. Para las mujeres es más probable ser infectadas a través de relaciones sexuales con un hombre. El VIH sigue afectando desproporcionadamente a las mujeres de raza negra e hispanas. La tasa de incidencia del VIH en mujeres de raza negra es casi 20 veces mas alta que en las mujeres de raza blanca. La tasa de infecciones nuevas en las mujeres hispanas o latinas es cerca de cuatro veces mayor a la de las mujeres de raza blanca. En el 2009, las mujeres de raza negra e hispanas juntas representaron el 83 por ciento de diagnósticos de VIH entre todas las mujeres y 14 por ciento de todos los diagnósticos de VIH en el condado de San Bernardino.

Muchos factores contribuyen al aumento de la tasa de infecciones en adultos de 47-65 años de edad. Uno de los factores es la falta de educación y mensajes de prevención orientada a los adultos mayores. Adultos entre las edades de 47-65 años que son activos sexualmente suelen a usar condones con menos frecuencia debido a menos preocupación de embarazo, de ese modo aumentando el riesgo de contraer el VIH. El uso de medicamentos para la mejora sexual entre este grupo también contribuye al riesgo de contraer Enfermedades de Transmisión Sexual, incluyendo el VIH. Además, la falta de comunicación entre adultos y sus doctores, referente a prácticas sexuales contribuye a la apariencia de bajo riesgo de contraer VIH entre personas de este grupo de edad y menos personas haciéndose la prueba del VIH. En el 2008 los adultos de 50 años y más representaron el 17 por ciento de nuevas infecciones de VIH en los Estados Unidos, el Dr. Maxwell Ohikhuare, Oficial de Salud, Condado de San Bernardino Departamento de Salud Publica atribuye esto a “la simple razón que las personas mayores no se hacen la prueba de VIH regularmente.”

Aunque el VIH es una enfermedad tratable, la educación y prevención continúan siendo la meta en detener la propagación de la infección en todos los grupos, especialmente entre las mujeres y

-más-

Gregory C. Devereaux  
County Administrative Officer

Board of Supervisors

BRAD MITZELFELT.....	First District	NEIL DERRY.....	Third District
JANICE RUTHERFORD.....	Second District	GARY OVITT.....	Fourth District
JOSIE GONZALES.....	Fifth District		

los adultos de 47-64 años. Es importante ser consciente de los retos que enfrentan las mujeres y los adultos de 47-64 años y asegurar que estén informados y que estén al tanto de cómo protegerse contra la infección. El Dr. Ohikhuare dice, "Hacerse la prueba de VIH es importante en los esfuerzos de prevención. Todos son animados a que incorporen la prueba de VIH en su cuidado médico rutinario."

Para más información sobre el VIH/SIDA y la prueba del VIH, llame al Condado de San Bernardino, Departamento de Salud Pública programa de SIDA al (800) 255-6560, o visite el sitio de la web en [www.KnowSBC.com](http://www.KnowSBC.com).

# # #